

عوارض حین دیالیز

کاهش فشار خون

- به علت مصرف بی رویه داروهای پایین آورنده فشارخون، از دست دادن بیش از اندازه مایعات بدن حین همودیالیز، خونریزی و نشت خون
- علائم: تهوع، استفراغ، سرگیجه، عرق سرد، افت فشار، افزایش نبض
- مداخلات: قطع مصرف داروهای فشارخون از 6 ساعت قبل از دیالیز، عدم مصرف غذا حین همودیالیز، بالا بردن پاها

کرامپ (گرفتگی عضلات)

- علت: افزایش سرعت دیالیز و کمبود سدیم مایع دیالیز
- علائم: درد شدید و ناگهانی و سفت شدن عضلات
- مداخلات: پیشگیری از افزایش وزن زیاد از حد در بین جلسات دیالیز، کاهش سرعت و افزایش زمان دیالیز، دریافت داروهای شل کننده عضلانی مانند دیازپام تا 2 ساعت قبل از شروع دیالیز، ماساژ و گرم نمودن عضو مبتلا

سندرم عدم تعادل

- علت: همودیالیز با سرعت و شدت زیاد در جلسات اول شروع درمان و افت سریع اوره خون علائم: تهوع، استفراغ، سرگیجه، افزایش فشار خون، سردرد، تاری دید، بی قراری و گاهی تشنج و کما
- مداخلات: کم کردن مدت دیالیز به ویژه در جلسات اول طوریکه در جلسه اول 2 ساعت، جلسه دوم 3 ساعت و جلسه سوم 4 ساعت باشد
- در صورت شروع علائم توقف دیالیز و دریافت محلول های نمکی و داروهای بی چون دگزامتازون

تهوع و استفراغ

- علت: افت فشارخون، واکنش تب زا به آب شهر، سندرم عدم تعادل و اضطراب
- مداخلات: دریافت داروهای ضدتهوع و استفراغ و آرامبخش در صورت بدتر شدن واکنش قطع دیالیز

تنگی نفس

- علت: افزایش حجم آب و نمک، کم خونی، آمبولی هوا و آمبولی ریه
- مداخلات: قرار گرفتن در وضعیت نیمه نشسته، دریافت اکسیژن، افزایش سرعت دیالیز، دریافت خون در صورت نیاز

آمبولی هوا

- علت: تجویز مایعات وریدی که پس از اتمام، هوا وارد مدار شود، خرابی و پارگی لوله ها و جداسدن محل اتصال
- علائم: درد قفسه سینه، سرفه، تنگی نفس، عرق سرد، سیانوس، تیرگی پوست، شوک و تشنج
- مداخلات: در حین تجویز مایعات وریدی و در پایان دیالیز در حین برگشت خون از مدار به گردش خون اصلی دقت شود که هوا وارد گردش خون بیمار نشود. در صورت بروز، قطع دیالیز و خوابانیدن بیمار به پهلو چپ در حالتی که سر پایین و پاها بالا باشد. تجویز اکسیژن، ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی

سردرد

- علت: اضطراب و علل روانی، افزایش فشار خون، واکنش نسبت به داروی خاص و سندرم عدم تعادل
- مداخلات: دریافت داروهای مسکن و آرامبخش، کاهش فشار با دارو

افزایش فشار خون

- علت: افزایش حجم مایعات به علت تجویز زیاد از حد محلول نمکی و یا خون، اضطراب و سندرم عدم تعادل
- علائم: سردرد، درد قفسه سینه، تاری دید، تپش قلب و تهوع
- مداخلات: زیاد کردن دور پمپ دستگاه در موارد ازدیاد آب و نمک، استفاده از داروهای پایین آورنده فشار خون و آرامبخش و استفاده از داروهای مدر غیر از نگهدارنده های پتاسیم

خونریزی

- علت: استفاده نامناسب از هیپارین، خروج سوزن از محل تزریق، جدا شدن محل اتصال لوله ها یا پاره شدن آنها
- علائم: کاهش فشار، درد جلوی قلبی، رنگ پریدگی، تعریق، شوک، تشنج و تغییر رنگ محلول دیالیز
- مداخلات: تزریق هیپارین در حداقل ممکن، در صورت پارگی لوله ها تعویض آنها در صورت مسمومیت با هیپارین تزریق سولفات

سحر شاه وردی

واحد آموزش و پیگیری بیمار

ارتباط با ما و پاسخگویی به سوالات: 03834259101-18

واحد آموزش و پیگیری بیمار: طبقه دوم - داخلی 221