



# آسم

مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار 9- 32264825-038

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار 1403

کد: PE/IN - KH-01-02

## در صورت بروز علایم زیر به پزشک مراجعه یا با

### اورژانس تماس بگیرید:

- => تشديد دوباره ای علایم و بروز حمله به شکل قبل
- => نیاز به استفاده ای مکرر از اسپری های سبز یا آبی
- => بروز تنگی نفس شدید یا عدم توانایی در نفس کشیدن و احساس قطع تنفس
- => درد یا سینگینی قفسه ای سینه که با استراحت و استفاده از اسپری ها (آبی و سبز) بهتر نشود
- => تندرشن و کوتاه شدن نفس ها یا تنفس سطحی و صدادار سرفه های طولانی، بیوسته و شدید پشت سر هم
- => سرفه همراه با خروج خلط زیاد و غلیظ (زرد یا سبز یا قهوه ای) یا خروج خلط خونی
- => بریده بریده و به سختی صحبت کردن یا عدم توانایی در تکلم
- => سردرد و سرگیجه، رنگ پریدگی یا تعریق شدید
- => سیاه شدن و کبودی لب ها و انگشتان
- => تورم زبان، حلق، گلو و لب ها یا تورم اطراف چشم،
- => تب و لرز
- => ضعف و بی حالی یا خواب آلودگی شدید یا کاهش سطح هوشیاری و بیهوشی

## صرف داروها:

در صورتی که هنگام ترخیص داروی خاصی (مثل کورتون خوارکی) برای شماتیک بز شده است فقط همان دارو را طبق دستور و تازمان معین شده صرف کنید.

درمان آسم در اغلب موارد نیاز به صرف آنتی بیوتیک ندارد، بنابراین از صرف خودسرانه‌ی این داروها جدا خودداری کنید، اما در صورت تجویز حتماً دارو را در زمان مشخص صرف کرده و دوره‌ی درمان را تا انتهای کامل نمایید.

از صرف ترکیبات مختلف تزریقی یا خوارکی کورتون دار (مثل دگرامتاژون، بتامتاژون، هیدروکورتیزون، پردنیزولون) به طور خودسرانه و بدون دستور پزشک کاملاً خودداری کنید و در صورتی که هنگام ترخیص برای شما از این گروه داروبی تجویز شده است تنها طبق دستور صرف کرده و حتماً در زمان مشخص شده دارو را قطع کنید.

اسپری های خود را در زمان مشخص و به روش صحیح استفاده کنید، استفاده‌ی منظم و دائم آنها حتی در زمان های بدون علامت از بروز علایم و حمله‌ها جلوگیری می‌کند.


اسپری هایی به رنگ آبی (سالبوتامول) و سبز (اتروونت) معمولاً اثر فوری دارند و برای درمان سریع علایم به کار می‌روند اما اثر آن‌ها کوتاه و موقت است، بنابراین باید همواره و در هر شرایطی یکی از آنها (ترجیحاً اسپری آبی) را همراه خود داشته باشید تا در صورت بروز هر یک از علایم (مثل تنگی نفس یا سرفه) بتوانید سریعاً از آن استفاده کنید.

در صورت نیاز به بیش از ۱ پاف از اسپری، باید ۱ دقیقه بین هر دو پاف فاصله باشد.

پس از استفاده از اسپری دهان خود را با آب بشویید تا باقی ماندن دارو در دهان باعث بروز عوارض نامطلوب نشود.

- ← توصیه می شود چند عدد از این نوع اسپری را تهیه کرده و در مکان های مختلف مثل کیف دستی، ساک ورزشی، داشبورد اتومبیل و داخل میز کار خود قرار دهید.
- ← اصول بهداشتی و پیش گیری از بروز بیماری های عفونی را کاملا رعایت کنید تا دچار سرماخوردگی و آنفلوانزا نشوید
- ← از شنا کردن در استخرهای عمومی خودداری کنید
- ← فرش و موکت ها را هر ۴-۷ روز یک بار به خوبی و با قدرت جارو بزنید و زیر فرش ها را کاملا تمیز کنید.
- ← تا حد امکان از جاروبرقی استفاده نمایید.
- ← از تجمع گرد و غبار بر روی وسایل جلوگیری کنید و کلمه های وسایل را هر ۳-۲ روز کاملا تمیز و گردگیری نمایید.
- ← هنگام نظافت منزل دهان و بینی خود را با ماسک یا پارچه مخصوص بپوشانید.
- ← از حداقل میزان مواد شیمیایی مثل شبشه پاک کن یا پاک کننده ی سطوح استفاده کنید.
- ← در صورتی که هنگام ورزش و فعالیت دچار بروز علایم می شوید می توانید ۱۵ دقیقه قبل از شروع ورزش از اسپری آبی استفاده کنید.
- ← هم چنین پیش از آغاز ورزش بدن خود را گرم و آماده سازی کرده و به آرامی شدت فعالیت را زیاد کنید و از ورزش کردن در هوای سرد خودداری نمایید.

- انواع کپک و مواد فاسد
  - پر و کرک پرنده‌گان و تماس با حیوانات و پارچه پر زدار
  - سوسک حمام و سایر حشرات خانگی
  - سرمای شدید یا تغییر دمای ناگهانی و شدید خشکی هوا
  - رطوبت شدید و فضاهایی با بخار آب اشباع ( مثل سونا و چشم‌های آب گرم )
  - ابتلا به سرماخوردگی و آنفلوانزا
  - استرس، اضطراب و فشارهای روانی
  - فعالیت جسمانی سنگین و ورزش ( به خصوص در هوای سرد یا آلوده )
- اصول مراقبت از خود در بیماری آسم:**
- ← در صورتی که علت آسم را می دانید از تماس با ان خودداری کنید مانند گرده گل، دود سیگار، انواع بوها و غذاهای، مواد شیمیایی مانند وايتکس ، حشره کشها، فضولات پرنده‌گان .....
  - ← نحوه استفاده صحیح از اسپری را بیاموزید.
  - ← به هیچ وجه بدون همراه داشتن اسپری های آبی یا سبز از منزل خارج نشوید.



آسم یک بیماری تنفسی غیرعفونی و غیر واگیر است که در آن راه های هوایی که مسیر عبور هوا (پس از بینی و حلق و نای) به سمت ریه ها هستند، تنگ و باریک شده و هوای کافی به خوبی و آسانی به ریه ها و داخل بدن نمی رسد و باعث بروز علایم زیر می شود :

- سرفه
  - تنگی نفس و سختی تنفس
  - گرفتگی و سنگینی قفسه ی سینه
  - خس سینه و تنفس صدادار
- هر چند معمولا نمی توان علت دقیق بیماری را مشخص کرد اما عوامل زیر در بسیاری از افراد ممکن است باعث بروز علایم و حتی ایجاد حمله ی شدید آسم شوند :
- گرد و خاک و غبار ( مثل گرد و غبار اسباب منزل و مبلمان )
  - گل ها و گیاهان ( به خصوص گرده ی گل ها )
  - آلودگی هوا و دوده و ذرات ریز معلق در هوا
  - برخی غذاهای ( گوجه فرنگی، هندوانه، ادویه ها، فلفل قرمز، زعفران، سس ها، غذاهای سور، بادام زمینی و گردو، غذاهای دریایی، کنسروها ، غذاهای آماده و بسته بندی، غذاهای دارای رنگ های مصنوعی، شکلات و شیرینی، نوشابه ها )
  - بعضی داروها ( بروفن و ناپروکسن، آتنولول و پروپرانولول )
  - عطرها و اسانس های مواد آرایشی و بهداشتی معطر
  - افشنانه و اسپری ( مثل خوشبو کننده هوا، حشره کش، پاک کننده ها، اسپری های ویژه ی آرایش مو )
  - اسیدها، مواد شیمیایی ( مثل مایع سفید کننده، جوهر نمک، مایع لوله بارکن، گازویل، بنزین و تیتر )
  - دود ( مثل دود سیگار و تنباکو، دود هیزم و چوب و زغال، دود اگزoz انومبیل، دود اجاق های غذاپزی با شعله ی زیاد )