



اسهال و استفراغ

مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله کاشانی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹-۳۲۲۶۴۸۲۵

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار ۱۴۰۳

کد: PE/IN-KH-01-03

- ♦ تشدید تهوع و استفراغ به طوری که قادر به خوردن و آشامیدن نباشد
- ♦ بی اشتهاای شدید (نخوردن غذا حداقل به مدت ۱۲ ساعت) عدم بهبود کامل اسهال پس از ۱۰ روز
- ♦ احساس تشنگی و خشکی دهان شدید و مداوم
- ♦ کاهش حجم ادرار (عدم دفع ادرار در طول ۸ ساعت) یا تیره شدن رنگ ادرار
- ♦ کاهش شدید وزن بدن
- ♦ ضعف و بی حالی شدید، سرگیجه و سبکی سر
- ♦ خواب آلودگی شدید
- ♦ سردرد شدید و درد یا سفتی حرکات گردن و سنگینی قفسه‌ی سینه
- ♦ تنگی نفس، تعریق یا رنگ پریدگی شدید

کلیه‌ی وسایل شخصی و بهداشتی از جمله حolle، صابون و ظروف غذاخوری خود را از بقیه جدا کنید.

در صورت امکان از صابون مایع استفاده کرده و پس از شستشو دستان خود را ضدغوفونی کنید.
ناخن‌های خود را کاملاً کوتاه کنید.

از توالات‌های مجهر به سیفون استفاده کنید، در صورت استفاده از توالات فرنگی بیش از استفاده از سیفون درب آن را بیندید، می‌توانید مقداری صابون مایع یا مایع ضدغوفونی کننده در داخل مخزن سیفون بریزید.

دستشویی و حمام را به طور مکرر بشویید و در صورت امکان ضدغوفونی نمایید.

دستگیره‌ی درها بوبیزه درب دستشویی و حمام و شیرهای آب را روزانه ۱-۲ نوبت تمیز و ضدغوفونی نمایید.
لباس و ملحفه‌های خود را از بقیه افراد جدا کرده و با آب کاملاً داغ بشویید و ضدغوفونی کنید.

در صورت بروز هر یک از عالیم زیر مجدداً به اورژانس یا پزشک مراجعه کنید :

- ♦ تشدید درد شکم یا بروز درد ثابت و مداوم در یک نقطه ی خاص شکم
- ♦ بدتر شدن عالیم و عدم پاسخ به مصرف داروها
- ♦ بهتر نشدن عالیم پس از ۳ روز
- ♦ دفع خون همراه مدفوع
- ♦ دفع مدفوع به رنگ سیاه شبیه به قیر
- ♦ وجود خون روشن یا تیره در محتویات استفراغ
- ♦ تپ بالا (بیش از ۳۸,۵ درجه)

جهت شروع رژیم می توانید از برنج یا غلات پخته شده، سیب، موز، نان، گوشت و سبزیجات پخته شده، سیب زمینی و ماست شیرین (با چربی کم) استفاده کنید.

غذا را با حجم کم در نوبت های زیاد مصرف کنید.

از مصرف غذاهای بسته بندی شده، فست فود، خامه، کره، مایونز، شکلات، غذاهای بسیار چرب یا پر ادویه و انواع سس ها خودداری کنید.

مواد غذایی خام و پخته را جدا و دور از هم تهیه، نگهداری و آماده سازی کنید. مواد غذایی تازه و فاسد شدنی را در یخچال نگهداری کنید.

تا زمان رفع علایم از تهیه و طبخ غذا برای سایرین خودداری کنید. موادغذایی و سبزیجات را به شکل خام مصرف نکنید.

گوشت و تخم مرغ را به طور کامل طبخ کنید و تا حد امکان از مصرف انواع گوشت به شکل کبابی خودداری کنید.

به میزان کافی استراحت کامل داشته باشید.

بلافاصله پس از خوردن غذا به رختخواب نروید و دراز نکشید.

از فعالیت فیزیکی و ورزش سنگین بویژه در هوای گرم که باعث تشدید کم آبی بدن می شود خودداری کنید.

دستان خود را به طور مرتب با آب گرم و صابون بشویید، این کار را بعد از هر بار استفاده از دستشویی، قبل و بعد از خوردن غذا، قبل و بعد از تماس با مواد غذایی حتماً انجام دهید.



جهت پیش گیری از کم آبی بدن می توانید از محلول آماده او آر اس استفاده کنید.

در صورت عدم دسترسی به محلول های او آرس می توانید یک قاشق چایخوری نمک و یک قاشق غذاخوری شکر را در چهار لیوان آب جوشیده ی سرد شده حل کرده و در هنگام تشنجی از آن بنوشید.

تا زمان بهبودی کامل روزانه مقدار زیادی آب و مایعات بنوشید، بهتر است هر ۱۵-۲۰ دقیقه مقدار کمی آب بنوشید و از مصرف مقدار زیاد مایعات در یک نوبت خودداری کنید، توصیه می شود از مایعات کاملاً سرد استفاده کنید.

از مصرف شیر، چای سنگین و نوشیدنی های حاوی کافئین مثل انواع قهوه و نسکافه خودداری نمایید.

استفاده از آبمیوه های بسته بندی شده و انواع نوشابه های گازدار و نوشیدنی های بسیار شیرین باعث تشدید اسهال خواهد شد، می توانید از آبمیوه های طبیعی و رقیق، مانند آب هویج یا نوشیدنی های حاوی نعناع استفاده کنید.

از مصرف آب هایی با منبع غیر مطمئن یا نامشخص خودداری کنید. در صورتی که در مسافرت هستید تنها از آب های بسته بندی شده استفاده کنید و در غیر این صورت آب را پیش از مصرف حداقل ۱۰ دقیقه بجوشانید.

دقت کنید که مصرف مایعات باعث بهبود اسهال یا استفراغ نخواهد شد ولی از کم آبی بدن و عوارض خطرناک آن جلوگیری می کند. توصیه می شود ۱-۲ ساعت پس از بروز استفراغ از خوردن و آشامیدن خودداری کنید.



اسهال و استفراغ عفونی، ناشی از التهاب معده و روده ها در اثر عفونت یا مسمومیت غذایی بوده و شایع ترین علت بروز آن ویروس ها هستند، عفونت با باکتری ها یا انگل ها هم ممکن است باعث ابتلاء به این بیماری و بروز اسهال، استفراغ یا هر دو شوند، هم چنین این بیماری می تواند باعث کم آبی بدن و از دست رفتن آب و نمک های ضروری بدن شود.

علایم شایع این بیماری شامل موارد زیر است:

- تهوع و استفراغ که اغلب ۱-۲ روز طول می کشد.
- اسهال که معمولاً ۱-۳ روز طول می کشد اما ممکن است تا ۱۰ روز ادامه یابد.

- تب خفیف

- بی اشتہایی

- دل پیچه و درد شکمی

- احساس خستگی

- ضعف و درد عضلانی

اگر عامل بیماری باکتری باشد تب شدیدتر است و اسهال ممکن است با دفع مخاطر یا خون همراه باشد.

به نکات و توصیه های زیر توجه کنید:

هدف اصلی درمان، کنترل علایم و رفع کم آبی بدن است.
اسهال عفونی به راحتی می تواند، از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.

شستن صحیح دستها می تواند از انتقال آن جلوگیری کند. علایم معمولاً ۳-۵ روز بعد بهبود می یابند اما ممکن است بهبودی کامل ۷-۱۰ روز طول بکشد.