

جراحی آندوسکپیک سینوس

مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله کاشانی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹-۳۲۲۶۴۸۲۵

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار ۱۴۰۳

کد: PE/IN-KH-01-05

← در صورتی که برای شما سرم شستشو تجویز شده است، بعد از برداشتن پانسمان، داخل بینی خود را با آن شستشو دهید.

← عدم شستشوی کافی بینی، سبب خشک شدن ترشحات و لخته ها و تشکیل کراست داخل بینی شده و باعث گرفتگی بینی می گردد.

در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر پس از جراحی سینوس با پزشک خود تماس بگیرید:

← خونریزی بیش از حد بینی که نمی توانید آن را کنترل کنید

← افزایش درد، قرمزی و تورم در اطراف محل جراحی

← تب بالا همراه با لرز

← ترشحات زرد مایل به سبز از بینی، به خصوص اگر بدبو باشد

← تغییرات در بینایی

توصیه های مراقبتی
۱) فعالیتهای ورزشی سنگین، شنا و ایروبیک تا دو ماه ممنوع است.

۲) معمولاً در داخل بینی تامپون گذاشته نمی شود.

۳) اما اگر به دلایلی در بینی شما تامپون گذاشته شده است، زمان بیرون آوردن آن به شما اطلاع داده می شود.

۴) این زمان معمولاً "۲ تا ۳ روز بعد از انجام جراحی است. این تامپونها کوچک بوده و درآوردن آن درد چندانی ندارد.

۵) پانسمان زیر بینی را در صورت آغشته شدن به خون و یا ترشحات، می توانید تعویض کنید ولی به هیچ عنوان به تامپون داخل بینی و قالب روی آن دست نزنید.

۶) بخیه ها و قالب روی بینی معمولاً در روز ۶ یا ۷ برداشته می شوند.

۷) استفاده از کمپرس یخ در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول به کاهش کبودی و تورم کمک میکند ولی پس از آن اثر چندانی ندارد. از کمپرس یخ به تناب استفاده کنید، مثال هر نیم ساعت بمدت یک ربع آنرا روی چشم و صورت نگهدارید.

۸) در روز اول از مایعات و پس از آن از غذاهای نرم استفاده کنید.

۹) در روزهای اول ممکن است ترشحات خونابه ای از بینی خارج شود که طبیعی است ولی در صورت خونریزی مراتب را اطلاع دهید.

۱۰) در زمان تعیین شده توسط پزشک جهت برداشتن پانسمان بینی مراجعه نمایید.

۱۱) فقط از داروهایی استفاده نمایید که برای شما تجویز شده است.

آموزش به بیمار بعد از عمل جراحی سینوس

- بعد از عمل جراحی بدليل پانسمان داخل بینی، تنفس از بینی ممکن نیست. تا هنگام برداشتن پانسمان از دهان باید تنفس کنید.
- زیر سر بیمار باید بعد از عمل کمی بالاتر قرار گیرد.



- به دلیل پانسمان داخل بینی ممکن است هر یک از حالات زیر برای شما پیش بیاید که بعد از برداشتن پانسمان مشکلات مزبور برطرف می‌گردد:

- (۱) احساس پری در صورت و بینی
- (۲) اشک ریزش، آبریزش بینی یا خروج خونایه از پانسمان بینی
- (۳) سردرد، درد صورت یا دندانها
- (۴) خشک شدن دهان، خرخر هنگام خواب
- (۵) عطسه مکرر

- هشت ساعت بعد از پایان عمل جراحی با اجازه پزشک یا پرستار بخش، از مایعات صاف و خنک استفاده نمایید.

- در صورت بروز تهوع همچنان ناشتا بمانید.
- در صورت تحمل مایعات می‌توانید از رژیم غذایی معمولی استفاده نمایید.

- در صورت مرطوب شدن پانسمان جلوی بینی، می‌توانید آنرا تعویض نمایید. مراقب باشید که پانسمان داخل بینی خارج نگردد.

- در صورتی که عطسه دارید با دهان باز عطسه کنید تا فشار به بینی وارد نیاید.

مراقبهای پس از عمل جراحی:

⇨ از مصرف داروهایی که انعقاد خون را مختل می‌کنند مانند آسپرین، بروفن، دیکلوفناک، پیروکسیکام، پلاویکس، وارفارین و سایر داروهای با اثر ضد انعقادی حداقل ده روز قبل از جراحی خودداری شود.

⇨ از استعمال دخانیات و در معرض دود سیگار، قلیان و پیپ بودن، حداقل به مدت شش ماه قبل از جراحی اجتناب شود.

⇨ در صورت ابتلا به هر عفونت ویروسی مثل سرماخوردگی، عمل جراحی باید حداقل به مدت سه هفته به تعویق افتاد، زیرا در این حالت، پرخونی بینی منجر به خونریزی بیش از حد در حین عمل می‌شود.


⇨ در تمام بیماران قبل از جراحی انجام دو اقدام

تشخیصی ضروری است:

۱. اندوسکوپی تشخیصی و سی تی اسکن سینوسها.

۲. در موارد خاصی با تجویز پزشک جهت کم کردن التهاب پیش از عمل ممکن است داروهای آنتی بیوتیک و استروئیدی تجویز شود که معمولاً "چند روز قبل از عمل مصرف آن شروع می‌شود.

⇨ در موارد خاصی با تجویز پزشک جهت کم کردن التهاب پیش از عمل، ممکن است داروهای آنتی بیوتیک و استروئیدی تجویز شود که معمولاً "چند روز قبل از عمل مصرف آن شروع می‌شود.



سینوسها چهار جفت حفره توخالی هستند که درون اسکلت صورت و در اطراف بینی تعییه شده اند و ترشحات آنها به درون بینی تخلیه می‌شود. در صورتی که این حفره‌ها درگیر عفونت بشوند؛ اصطلاحاً به آن سینوزیت گفته می‌شود.

عوامل زمینه ساز سینوزیت چیست؟

التهاب بینی و سینوس یا همان سینوزیت به دلایل مختلف از جمله ویروسها، قارچها، مواد آلرژی زا، آلودگی هوا و استعمال دخانیات رخ می‌دهد.

آندوسکوپی سینوس چگونه است:

آندوسکوپ بینی، لوله فلزی ظرفی و باریکی است که داخل آن دستگاهی دقیق شامل عدسی‌ها و منشورهای مختلف تعییه شده است.

یک طرف آن داخل بینی یا سینوس می‌شود و طرف دیگر آن، مقابل پزشک یا دستگاهی قرار می‌گیرد که مناظر معاينه شده را روی صفحه نمایش نشان می‌دهد آندوسکوپ همچون تلسکوپ عمل می‌کند و از ساختمانهای داخل بینی و سینوس منظره و دیدی عالی به جراح می‌دهد.

