



مولتیپل میلوما

مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله کاشانی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹-۳۲۲۶۴۸۲۵


Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار ۱۴۰۳

کد: PE/ONCO-KH-01-18

در چه صورتی باید به پزشک مراجعه کنید؟

وجود علائم عفونت شامل (تب، لرز و افزایش ضربان قلب)



بیوست

تهوع و استفراغ

بی‌حسی و مورمور

شدن در پاهای

تغذیه مناسب به معنی مصرف کالری کافی برای حفظ وزن مناسب و مصرف پروتئین کافی برای حفظ قدرت و توان جسمانی توصیه می‌شود. مایعات به میزان کافی استفاده کنید. غذاها را در حجم کم و تعداد زیاد مصرف کنید.

از مواد محرك اشتها در صورت صلاحدي پزشك استفاده کنید.

به دليل مصرف داروهای کورتیکوساستروئید باید مراقب افزایش فشارخون و افزایش قند خون باشید.

در صورت مصرف قرص آسپرین، حتماً قرص آسپرین را وسط و عده غذایی هنگام ناهار مصرف کنید.

به دليل احتمال ایجاد ترومبوفیلیت از روی هم انداختن پاهای اجتناب کنید و همچنین از جورابهای واریس استفاده کنید.

از وسائل کمکی در راه رفتن مثل واکر استفاده کنید.

در صورت وجود علائمی مانند تب، لرز و یا زیاد شدن ضربان قلب که احتمال ابتلا به عفونت را نشان می‌دهد به اطلاع پزشک برسانید شاید نیاز باشد تحت درمان دارویی قرار بگیرید.

به دليل احتمال ابتلا به عفونت توصیه می‌شود که تا حد امکان از مناطق شلوغ و بیمارانی که دچار سرما خوردگی و یا سایر بیماری‌های مسری شده‌اند دوری نمایید.

به دليل احتمال ابتلا به بیوست، از نرم کننده مدفوع استفاده کنید.

در برخی موارد درمان حمایتی مانند استفاده از کمربندهای طبی و ... نیز انجام می‌شود.

همچنین ممکن است به دلیل احتمال ابتلا به عفونت‌های ویروسی داروهایی مانند آسیکلولیر جهت پیشگیری تجویز شود.

همچنین جهت جلوگیری لخته شدن خون از داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین با توجه به جواب آزمایشات و طبق نظر پزشک استفاده شود.

آموزش‌های خودمراقبتی:

* بیماری مولتیپل میلوما اغلب با درد همراه است که برای کاهش درد استفاده از ماساژ یا طب سوزنی ممکن است کمک کننده باشد.

* در هنگام درد باید از انجام فعالیت شدید اجتناب کنید. در صورت وجود درد از مسکن مناسب طبق دستور پزشک استفاده کنید.

* در صورت فشار روی نخاع طبق صلاحیت پزشک ممکن است نیاز به عمل جراحی باشد.



بیماری مولتیپل میلوما چه علائمی دارد؟

۱. درد استخوانی معمولاً در ناحیه کمر
۲. بی‌حسی و مور مور شدن در پاها
۳. شکستگی استخوانی معمولاً در ستون مهره‌ها
۴. احساس خستگی و ضعف شدید
۵. احساس تشنگی شدید
۶. تب و عفونت مکرر
۷. کاهش وزن حالت تهوع یا بیوست
۸. تکرر ادرار

مولتیپل میلوما چگونه تشخیص داده می‌شود؟

* تست‌های خونی
* تست‌های ادراری

* گرفتن عکس با اشعه ایکس
* بیوپسی یا نمونه برداری از مغز استخوان

بیماری مولتیپل میلوما چگونه درمان می‌شود؟

روش درمان عمدتاً به مرحله و علائم بیماری بستگی دارد.
دارو درمانی و همچنین پیوند مغز استخوان درمان اصلی این بیماری است.

(دارو به صورت خوارکی یا تزریقی مورد استفاده قرار می‌گیرد).

درمان دارویی (طبی) معمولاً به صورت سریاکی در بیمارستان یا مطب انجام می‌شود.

مولتیپل میلوما چیست؟

این بیماری در گلبول‌های سفید که مسئول ایمنی بدن هستند، شروع می‌شود. این گلبول‌های سفید دسته‌ای هستند که آنتی بادی (پادتن) می‌سازند. در این بیماری سلول‌های ناجا در مغز استخوان جمع می‌شوند و سلول‌های خونی سالم را از بین می‌برند و به جای تولید آنتی بادی‌های مفید، پروتئین‌های غیرطبیعی تولید می‌کنند، که می‌توانند عوامل خطرناکی باشند.

عوامل خطر:

عوامل زیر در ایجاد بیماری دخیل هستند:

== سن

== نژاد

== در معرض تابش اشعه بودن

== مواجهه یافتن با آفت کش‌ها و رنگ‌ها

بیماری مولتیپل میلوما

