



بی اشتهايی ناشی از کموترایپی

مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹ - ۰۳۸-۳۲۲۶۴۸۲۵

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار ۱۴۰۳

کد: PE/ONCO - KH-01-04

- ⇒ سعی کنید بعضی چیزها را زمان خواب بخورید.
- ⇒ از غذای نرم تر استفاده کنید.
- ⇒ برنامه غذایی تان را با غذاهای مطلوب‌تان برنامه‌ریزی کنید.
- ⇒ اجازه دهید شخص دیگری برایتان غذا تهیه کند.
- ⇒ بک محل دوست داشتنی و لذت بخش برای غذا خوردن ایجاد کنید و غذا را به نحو جذابی جلوه بدهید.
- ⇒ از خوردن غذاهای سرشار از پروتئین، قبل از شیمی درمانی جلوگیری کنید.

با آرزوی سلامتی

برای کاهش بی اشتهايی ناشی از کموترایپی چه باید کرد؟

- ⇒ از نگاه کردن و بوئیدن غذاها بپرهیزید.
- ⇒ غذاهای ترش بخورید. (مگر این که زخم دهانی داشته باشید)
- ⇒ غذاهای سرد بخورید.
- ⇒ غذاهای کمتری در یک وعده بخورید.
- ⇒ هر موقع که گرسنه هستید غذا بخورید.
- ⇒ برای نوشیدن مایعات از بی استفاده کنید.
- ⇒ قبل و بعد از غذا، دهانتان را با آب شستشو دهید.
- ⇒ ادویه جات را در غذا افزایش دهید (در صورتی که زخم دهانی ندارید)
- ⇒ داروهای ضد درد را نیم تا یک ساعت قبل از غذا خوردن استفاده کنید.
- ⇒ در زمان خوردن غذا آرام و بدون عجله باشید. در صورت تمایل، حین عدا خوردن به موسیقی گوش دهید.
- ⇒ اگر در صحیح اشتهای بهتری دارید، یک صبحانه مفصل و خوب بخورید.
- ⇒ مایعات را ۳۰-۶۰ دقیقه قبل یا بعد از غذا بنوشید.
- ⇒ در طول روز وعده های غذایی کوچک بخورید.
- ⇒ میان وعده ها را در دسترس و آماده نگهداشید.
- ⇒ نوشیدنی های پر انرژی (مانند شیر همراه عسل) بنوشید.
- ⇒ بعد از خوردن غذا استراحت کنید.

روش های برطرف کردن تهوع و استفراغ

- ۷) در صورتی که مشکل شما داشتن تهوع صحبتگاهی است، قبل از برخواستن از رختخواب بیسکویت یا نان سوخاری میل کنید. (در صورتی که زخمی در دهان شما وجود دارد، این کار را انجام ندهید)
- ۸) قطعات یخ، آب نبات یا قرص نعنایی بمکید. (در صورتی که دچار زخم دهان هستید از آبنبات ترش استفاده نکنید)
- ۹) از بوهایی که شما را آزار می دهد (بوی غذا، دود، عطر) اجتناب کنید.
- ۱۰) لباس های آزاد و گشاد بپوشید.
- ۱۱) هنگامی که احساس تهوع دارید به آهستگی، چند نفس عمیق بکشید.
- ۱۲) با حرف زدن با دوستان و خانواده، تماسای تلویزیون یا گوش کردن به موسیقی فکر خود را منحرف کنید.



در مورد تهوع و استفراغ چه باید کرد؟

تهوع و استفراغ از شایع ترین عوارض جانبی داروها هستند. شدت احساس تهوع و مدت آن به داروهای استفاده شده بستگی دارد. بعضی اوقات اما به ندرت، تهوع و استفراغ شدید ممکن است برای چند روز ادامه یابد. تهوع، استفراغ با ایجاد تغییراتی در روش های صرف غذا و با استفاده از داروهای ضد تهوع کاهش می یابد.

