



## سرگیجه

مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله کاشانی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹- ۰۳۸-۳۲۲۶۴۸۲۵

[Kashanihp.skums.ac.ir](http://Kashanihp.skums.ac.ir)

واحد آموزش به بیمار ۱۴۰۳

کد: PE/NUR-KH-01-03

### در صورت بروز هر یک از علایم زیر مجدداً به اورژانس یا پزشک مراجعه کنید:

- سردرد شدید یا بروز جدید و ناگهانی سردرد
- تب ۳۸ درجه یا بیشتر
- اختلال دید یا دویینی
- اختلال تکلم / عدم توانایی در صحبت کردن
- ضعف، بی‌حسی یا فلج هر یک از اندام‌ها
- بروز تشنج
- گیجی و منگی و بیهوشی ناگهانی
- درد قفسه‌ی سینه
- رنگ پریدگی شدید و تعریق سرد
- استفراغ‌های مکرر و شدید
- ضربه به سر
- درد شدید گوش یا خروج ترشحات چرکی از گوش
- احساس سرگیجه‌ی مداوم و دائم (غیر حمله‌ای)
- تشدید علایم یا عدم هرگونه بهبودی پس از ۲ هفته

از مصرف غذاهای شور خودداری کنید.

تا حد امکان از رانندگی حداقل به مدت ۲ هفته خودداری کنید.

هنگام حضور در اتوبیل به هیچ وجه مطالعه نکنید.

از هیجانات عاطفی، واکنش‌های شدید احساسی، بحث و مجادله پرهیزید.

عوامل ایجاد تنفس و استرس و فشار عصبی را شناسایی کرده و تا حد امکان از آنها دوری کنید.

استراحت کافی و خواب منظم داشته باشید و در ساعات مشخص به رختخواب بروید (۸-۱۰ ساعت در شبانه روز)

از تماشای طولانی مدت تلویزیون، کار کردن زیاد با کامپیوتر یا انجام بازی‌های کامپیوترا پرهیز کنید.

از شنا کردن، کوهنوردی، انجام ورزش‌ها و فعالیت‌های سنگین بدنی خودداری کنید.

از حضور در محیط‌هایی با نورهای شدید، رنگی و متغیر خودداری کنید.

از مصرف سیگار و قلیان تا حد امکان خودداری کنید.

برنامه‌ی غذایی منظم و کامل داشته باشید و از گرسنگی طولانی مدت جلوگیری کنید.

مایعات کافی بنوشید تا دچار کم آبی نشوید.

در صورت بروز کاهش شنوایی همراه با احساس شنیدن صدای سوت در گوش به طور مداوم به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنید.

- از مصرف خودسرانه و افراطی داروهای خواب آور و آرام بخش پرهیز کنید.
- از هرگونه تغییر حالت ناگهانی (مثلا از حالت نشسته به ایستاده) پرهیز کنید.
- هنگام برخاستن از رختخواب ابتدا برای چند دقیقه بنشینید سپس برخیزید.
- از قرار گرفتن در ارتفاع بالا مانند صعود از نردبان یا چهارپایه خودداری کنید.
- از انجام فعالیت هایی که نیاز به بالا نگاه داشتن طولانی مدت سر یا بازوها دارد (مثل آویزان کردن پرده یا تعویض لامپ) خودداری کنید.
- از خم کردن ناگهانی یا سریع سر و هم چنین پایین نگاه داشتن سر برای مدت طولانی (مثلا برای تمیز کردن زمین) پرهیز کنید.
- هنگامی که در منزل تنها هستید از رفتن به حمام خودداری کنید زیرا احتمال افتادن و سقوط زیاد است.
- هنگام تنها بیی در منزل همواره گوشی تلفن یا تلفن همراه خود را در دسترس و نزدیک خود قرار دهید.
- کفش های راحت و بدون پاشنه بپوشید و در صورتی که قادر به حفظ تعادل خود نبوده و هنگام راه رفتن دچارزمین خوردنگی می شوید از راه رفتن زیاد و غیر ضروری خودداری کرده و هنگام راه رفتن از کنار دیوارها حرکت نمایید، هم چنین بهتر است از عصا یا واکر استفاده کنید.
- هنگام بارندگی یا یخبندان از منزل خارج نشوید.

سرگیجه اغلب به شکل حمله ای رخ می دهد اما طول مدت حملات و میزان تکرار یا تناوب آنها می تواند بسیار متفاوت باشد. باحساس سرگیجه ممکن است با حرکات سر، تغییر وضعیت بدن (نشستن، ایستادن یا خوابیدن)، حرکت کردن و راه رفتن، سرفه و عطسه تشدید شود.

### **علایم زیر گاهی همراه با سرگیجه و به صورت گذرا ایجاد**

#### **می شوند:**

تهوع و استفراغ، سردرد خفیف، حساسیت به نور یا صدا، تاری دید، تعریق، ضعف و بی حالی، تپش قلب صدای سوت یا زنگ در گوش / وزوز گوش

### **تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه**

#### **کنید:**

- سرگیجه معمولا با تغییر حالت بدن و یا خوابیدن به یک سمت مشخص (گوش درگیر بیماری) تشدید می شود بنابراین از خوابیدن به این سمت خودداری کنید.
- هنگام خواب سر خود را کاملا بالا قرار دهید
- در صورتی که پژشک هنگام ترجیح برای کنترل سرگیجه داروی خاصی تجویز کرده است تنها همان دارو را در زمان مشخص مصرف کنید و شخصا بدون نظر پژشک اقدام به قطع مصرف دارو (بویژه به صورت یک باره و ناگهانی) نکنید.
- در صورتی که داروی خاصی به طور مداوم برای سایر بیماری ها مصرف می کنید جهت ادامه ای درمان با پژشک مشورت کرده و از قطع یا تغییر میزان مصرف داروها به طور خودسرانه خودداری کنید.

سرگیجه شامل مجموعه ای وضعیت هایی مانند سبکی سر، سیاهی رفتن چشم ها، چرخش سر، چرخش محیط و اتاق، احساس حرکت اجسام یا محیط اطراف، تاییدن، پرتاب شدن، سر خوردن و خالی یا گود شدن زیر پا می شود، اما سرگیجه حقیقی فقط شامل احساس چرخیدن خود فرد یا چرخش محیط اطراف می باشد.

### **علل سرگیجه:**

- کم آبی بدن ( ناشی از اسهال، استفراغ، تب و سایر علل )
- استرس، اضطراب و فشارهای عصبی - روانی
- افسردگی
- بی نظمی ضربان قلب
- حساسیت به مواد مختلف
- برخی مسمومیت ها
- بیماری های ویروسی مانند سرماخوردگی یا آنفلوانزا
- تنفس های سریع و کوتاه یا بسیار عمیق
- صرف سیگار، تنباکو، الکل
- کمبود اکسیژن
- کم خونی ، خونریزی
- کاهش لحظه ای فشار خون
- افت قند خون
- سدرم قبل از قاعده ای و قاعده ای و یا بارداری
- بعضی از داروها ( آرام بخش ها و داروهای روانپزشکی )