



## کله سیستیت و برداشتن کیسه صفرا

مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله کاشانی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹- ۰۳۸-۳۲۲۶۴۸۲۵

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار ۱۴۰۳

کد: PE/SUR-KH-01-06

### در صورت مشاهده هرگونه تغییر در محل عمل جراحی

**سریعاً به پزشک خود مراجعه کنید:**

- در صورت داشتن علائم التهاب و عفونت مثل: تب بالای ۳۷/۲ بیشتر از دو روز متوالی، قرمزی، تورم و سفت شدن محل عمل، ترشحات زرد و بدبو و حساسیت و درد اطراف زخم جراحی
- در صورت درد مداوم شکم، به خصوص اگر به مرور بدتر شود.
- تهوع یا استفراغ شدید، برقان یا زردی
- نداشتن دفع مدفوع بیش از سه روز پس از جراحی
- عدم توانایی دفع گاز بیش از سه روز پس از جراحی
- اسهال مکرر
- فوراً به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
- در صورتی که به روش باز جراحی شما انجام شده است ظرف مدت ۷ تا ۱۰ روز بعد از عمل، جهت کشیدن بخیه‌ها به اورژانس یا پزشک خود مراجعه نمایید.

• روز اول بعد از ترجیح مایعات و غذای نرم مصرف کنید و از روز دوم در صورتیکه احساس نفخ نداشته باشد، می‌توانید غذای معمولی استفاده نمایید.

• پس از برداشتن کیسه صفرا از یک رژیم غذایی حاوی پروتئین و کربوهیدرات مثلاً برنج، ماکارونی یا نان، میوه‌های پخته و سبزی زمینی آب پز استفاده کنید.

• از خوردن غذاهای نفخ و پرچربی بعد از عمل خودداری کنید.  
• تا یک هفته پس از جراحی از رژیم غذایی پرفیبر مصرف شود و از بیوست جلوگیری شود، مصرف میوه و سبزیجات توصیه می‌شود.

• طی ۴ تا ۶ هفته آینده به آرامی چربی را وارد رژیم غذایی کنید، بهترین راه تامین چربی استفاده از چربی‌های گیاهی، گوشت بدون چربی، شیر کم‌چرب و گوشت ماهی است.

• در اکثر موارد در اولین روز بعد از عمل مرخص خواهد شد.  
• بعد از ۳-۴ روز می‌توانید رانندگی کنید، بهتر است تا پک هفته تنها به سفر نروید.

• می‌توانید از روز پنجم بعد از عمل فعالیت عادی داشته باشید.  
• بهتر است تا یک هفته فعالیت جنسی نداشته باشید.

• در صورت تمایل یک هفته بعد از عمل می‌توانید به سرکار خود باز گردید، و مدت مرخصی استعلامی بعد از لایراسکوپی سنگ صفراوی ۲ تا ۳ هفته است.

• بهتر است از برداشتن اجسام سنگین تا چند ماه خودداری کنید.

• ممکن است از درد اطراف ناف بعد از لایراسکوپی، شاکی باشید که به علت تحرک شماست.

• داروهای تجویزی را منظم مصرف نموده و در تاریخ تعیین شده به پزشک مراجعه نمایید.

• قبل از ترجیح هر سوالی در ذهن خود دارید، از پرستار و پزشک خود پرسید.

• داروهای تجویز شده توسط پزشک را در منزل طبق ساعتهاي دستور داده شده بطور دقیق مصرف نمایید.

## مراقبت بعد از عمل:

- مدت زمان لازم تا هوشیاری کامل در افراد مختلف، متفاوت و به طور متوسط یک تا سه ساعت است. در این مدت اتفاق بیمار باید خلوت باشد تا پرستار بخش بتواند علایم حیاتی بیمار را کنترل کنند.
- ممکن است بیمار استفراغ کند که بلافاصله به پرستار خود اطلاع دهد.
- شش تا هشت ساعت بعد از عمل جراحی لپاروسکوپی طبق دستور پزشک معمولاً به بیمار مایعات همچون آب، چای، آب میوه و آب کمپوت داده می شود و در صورتی که بتواند تحمل کند به بیمار رژیم معمولی نرم کم چربی به بیمار داده می شود.
- نفس عمیق بکشید، تا دچار مشکل ریوی نشوید و در هنگام بروز سرفه جهت جلوگیری از درد محل عمل را با دست بگیرید.
- جهت شروع فعالیت ها توصیه می شود که با اجازه پزشک و پرستار، فعالیت قدم زدن بلافاصله بعد هوشیاری کامل شروع شود برای راه رفتن، ابتدا با کمک در لبه تخت بنشینید و اگر سرگیجه و تهوع نداشtid با کمک راه بروید، زیرا دراز کشیدن به مدت طولانی بهبودی شما را به تاخیر می اندازد.
- می توانید ۱ تا ۲ روز بعد از ترجیح به حمام رفته و دوش سرپایی بگیرید، محل عمل را شست و شو و خشک نمایید.



## درمان به چند روش انجام می شود:

**درمان دارویی:** درمان خوراکی برای از بین بردن برخی سنگهای کوچک در صورتی که کلسیم رسوب نکرده باشد؛ تجویز می شود. این درمان برای افرادی که نمی توانند جراحی کنند، مناسب است.

**درمان طبی:** استفاده از آندوسکوپی ERCP جهت تخلیه و شکستن سنگهای مجرای صفوای

### درمان جراحی :

« کله سیستکتومی (برداشتن کیسه صفوای) از را لپاروسکوپی: این روش از طریق یک برش یا سوراخ کوچک از راه دیواره شکم و ناف صورت می پذیرد.

« کوله سیستوستومی (برداشتن کیسه صفوای) به روش باز: در طی این روش کیسه صفوای باز شده و سنگها، صفوای و ترشحات خارج می شوند.

### قبل از عمل کیسه صفوای:

« در صورت ابتلا به بیماری آن را به پزشکان خود اطلاع دهید.

« تمام داروهای مصرفی را به اطلاع پزشک تان برسانید.

« اگر وارفارین، آسپرین، پلاویکس مصرف می کنید آنرا به اطلاع پزشک خود برسانید.

« ۸ ساعت قبل از عمل ناشتا باشید.

« وسایل فلزی (گل سر، زیورالات، دندان مصنوعی و ...) باید خارج شود.

« لاک ناخن پاک شود.

« روز قبل از عمل باید حمام کرده، موهای زائد روی شکم با ریش تراش یا کرم موبایر، زدوده شود و داخل ناف شستشو شود.

کوله لیتیازیس (سنگهای صفوای) و کوله سیستیت (التهاب کیسه صفوای) چیست؟

کیسه صفوای ارگان گلابی شکلی است که در سطح تحتانی کبد و چسبیده به آن قرار دارد؛ و محل ورود صفوای تولید شده توسط کبد می باشد.

کوله لیتیازیس یا سنگهای صفوای از اجزاء جامد صفوای ساخته شده و از نظر اندازه و شکل، دارای ترکیبی متفاوت می باشند.

کوله سیستیت عارضه حاد سنگهای صفوای محسوب می شود. اغلب بیماران مبتلا به کله سیستیت، سنگ کیسه صفوای دارند.

### نشانه های سنگ صفوای چیست؟

« بسیاری از افراد دارای سنگ صفوای نشانه ای ندارند

« در در قسمت بالای شکم و زیر دنده های انتهایی راست حس می شود و به کتف و شانه راست و یا به اطراف معدده (پی گاستر) انتشار می یابد.

### سایر نشانه های سنگ صفوای عبارتند از :

« تهوع و استفراغ

« برقان (زردی)

« تب ولرز

« مدفوع خاکستری

« نفخ و سوء هاضمه

**اقدامات تشخیصی می تواند:** آزمایش خون، سی تی

اسکن، MRI، سونوگرافی کیسه صفوای باشد.

