



معیار وزن جهت شناسایی بیمار مستعد ترومبوآمبولی

Criteria WELLS VTE

نمره	یافته های بالینی برای آمبولی ریوی PTE	نمره	یافته های بالینی برای DVT
+۳	وجود علائم بیماری DVT	+۱	جراحی، صدمه یا گچ در اندام تحتانی، پارزی یا پارالایزی
+۳	تشخیص افتراقی دیگری که علائم بیمار را توجیه کند نداشته باشیم	+۱	بستری در تخت بیش از ۳ روز یا جراحی بزرگ در ۴ هفته قبل
+۱,۵	ضربان قلب بالای ۱۰۰	+۱	تندرنس در مسیر وریدهای پشت زانو یا رانی
+۱,۵	بیحرکتی بیش از ۳ روز یا جراحی در ۴ هفته اخیر	+۱	تورم یک عضو
+۱,۵	سابقه قبلی از TE یا DVT	+۱	ادم گوده گذار در اندام مبتلا
+۱	وجود خلط خونی	+۱	تورم بیش از ۳ سانتی متر یک پا نسبت به پای دیگر در ۱۰ سانتی متر زیر زانو
+۱	بدخیمی حاد یا درمان شده در طول شش ماه قبل یا درمان تسکینی	+۱	تورم عروق محیطی که ناشی از واریس نباشد
		+۱	داشتن سابقه DVT قبلی
		+۱	بدخیمی حاد یا درمان شده که شش ماه قبل بوده
		+۳	تزریق وریدی دارو
		-۱	تشخیص جایگزین با احتمال بیشتری نسبت به DVT
	جمع نمرات		جمع نمرات
	امتیاز ریسک ترومبوآمبولی ریوی (PTE)		امتیاز ریسک ترومبوآمبولی وریدی (DVT)
> ۲	احتمال کم	0 - 1	احتمال کم
۶ - ۲	احتمال متوسط	1 - 2	احتمال متوسط
< ۶	احتمال بالا	3 - 8	احتمال بالا

بیماران با ریسک بالا:

سن بالای ۶۰ سال - سن بین ۴۰-۶۰ و دارای یک فاکتور خطر دیگر - سابقه VTE در افراد خانواده یا خود بیمار - چاقی - انعقاد پذیری اکتسابی یا ارثی - بیماری زمینه ای مثل بیماری قلبی - عفونت - سکتته های اخیر - بیماریهای التهابی - جراحی سر فمور - آرتروپلاستی زانو - شکستگی لگن - ترومای شدید - صدمات نخاعی یا اعمال جراحی سرطان

بیماران با ریسک پایین:

سن کمتر از ۴۰ سال - مدت زمان بیهوشی کمتر از ۳۰ دقیقه

بیماران با ریسک متوسط:

بیمارانی که تحت عمل جراحی کوچک قرار گرفته اند ولی سن بین ۴۰-۶۰ سال دارند و به بیهوشی بیشتر ۳۰ دقیقه نیاز دارند - قفسه صدی - جراحی اعصاب

